

Скарлатина


Скарлатината е заболяване, засягащо най-вече [деца](#) от 3 до 13 годишна възраст (децата до 6 месечна възраст са предпазени от [антителата](#), придобити от майката), предимно в зимния период на годината. Причинители са [бактерии](#) от рода на бета-хемолитичния стрептокок от група А, отделят [токсини](#) и [алерген](#), който предизвиква късни усложнения. Заболяването се предава по въздушно-капков път, но е възможно заразяване чрез храна и замърсени предмети. Обикновено източник са болните от скарлатина, болни от стрептококови [ангини](#) и [назофарингити](#). Типично за това заболяване е развитието на регионални епидемии в обществени заведения, като сезонният пик обикновено се проявява през месеците от октомври до март.^[1] [Инкубационният](#) период е 1 – 12 дни, но най-често 2 – 4 дни.^[1] Тъй като заболяването е следствие от бактериална инфекция, след оздравяване не се придобива траен имунитет и е възможно да се срещат повторни заболявания. Контакт с оздравелия след карантинния период не е опасен.

Особености

Характерно за скарлатината е последващото лющене на кожата, включително на дланите и ходилата. Заболяването често причинява усложнения: [синусит](#), [отит](#), [лимфаденит](#), [артрит](#), [менингит](#), възпаление на [средното ухо](#), засягане на [сърцето](#), на [ставите](#) и др. Тежки усложнения, които се дължат на алергично-имунна реакция, са [гломерулонефрит](#), [ревматизъм](#) и сериозно увреждане на [бъбреците](#).

Лечение

Лечението се извършва с лекарски контрол, като за най-успешно приложим [медикамент](#) се счита [пеницилинът](#) и неговите препарати, при изява на [алергия](#) към тях се използва [еритромицин](#), а при липса на ефект – [цефалоспориини](#). Важно е да се отбележи, че трябва да бъде проведено контролно изследване на урината за [хематурия](#) на болния от скарлатина две седмици след нейното начало.^[1]



Симптоми

Скарлатината се характеризира с внезапно бурно начало, като първите симптоми обикновено са кашлица, висока температура, болки в гърлото, повръщане, болки по тялото, главоболие и тахикардия.^[1]

Други общи симптоми на скарлатината включват:

- Повишена [температура](#) (около 39 °C).
- Силна отпадналост, [главоболие](#) и [повръщане](#).
- Силно зачервено и болезнено [гърло](#); увеличени [сливици](#), често покрити с [гнойни](#) налепи.
- Обрив под формата на дребни червени петънца; появява се в [слабините](#), сгъвните повърхности на крайниците; разпространява се към [гърдите](#), [корема](#), [шията](#).

[Езикът](#) е малиново-червен.